FUNGICIDA

CRONOS 25 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2803

CRONOS 25 SC, es un funguicida recomendado para el control de Oídio en vides.

COMPOSICIÓN:

Quinoxifeno (*)	25% p/v (250 g/l)
Coformulantes c.s.p.	100 % p/v (1 l)

(*) Éter 5,7-dicloro-4-quinolil 4-fluorofenílico

<< LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote Nº:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA - CHILE

Hualong Chemical Industry Co. Ltd.
17A Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road
Hangzhou 310004- CHINA

GLEBA S.A.
Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903)
Melchor Romero, La Plata
Provincia de Buenos Aires - Argentina

Distribuido por:

anasac

ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

CRONOS 25 SC, es un fungicida, cuyo ingrediente activo Quinoxifeno pertenece al grupo químico de las Quinolinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación de la suspensión concentrada usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC, antiparras, mascara con filtro, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

CRONOS 25 SC, es muy tóxico para algas y microcrustáceos, prácticamente no tóxico para aves y peces y virtualmente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>
<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>
<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>
<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>
<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Triple Lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:
En caso de contacto cutáneo: retire la ropa y zapatos contaminados. Limpie bien los restos del producto y luego lave la piel con agua y jabón. **En caso de contacto ocular:** lave inmediatamente los ojos con agua tibia, manteniendo los párpados abiertos, por lo menos durante 15 minutos. **En caso de inhalación:** retirar al paciente del área expuesta y llevarlo al aire libre. **En caso de ingestión:** si la persona está consciente, administre una taza de agua, pero NO PROVOQUE vómitos.
En todos los casos mantenga al paciente en reposo mientras se le envía al hospital más cercano.
Síntomas: vómitos, dolor faríngeo.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia:
(2) 7771994 (CORPORACIÓN RITA); (2)4869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **CRONOS 25 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.
No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingrediente Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje.

INSTRUCCIONES DE USO

CRONOS 25 SC es un fungicida de uso preventivo, de contacto recomendado para el control de oídio en vides.

Instrucciones de uso:

CRONOS 25 SC otorga flexibilidad en su uso permitiendo entregar un mayor o menor período de protección en función de la dosis empleada. El usuario puede optar por periodos cortos o periodos largos de protección y en función de ello seleccionar la dosis del cuadro adjunto. También debe considerarse que las recomendaciones en cada localidad varían dependiendo de las condiciones predisponentes a la incidencia de la enfermedad y están sujetas a las condiciones ambientales específicas y a la susceptibilidad varietal de cada parronal o viñedo.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (cc/hL)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
VID	Oídio	7 - 10	Aplicar cada 7 a 14 días para periodos cortos de protección, en función de la presión de la enfermedad. Bajo condiciones de alta presión de la enfermedad aplicar 9 -10 cc/hL y use menores intervalos de aplicación. En casos de baja presión de la enfermedad aplicar 7 - 8 cc/hL.	14
VID	Oídio	14 - 20	Aplicar cada 14 a 21 días para intervalos largos de protección, en función de la presión de la enfermedad. Usar dosis mayor, 18 - 20 cc/hL y los menores intervalos en condiciones de alta presión de la enfermedad. En situaciones de menor presión usar dosis menores, 14 - 16 cc/hL.	14

Instrucciones de uso:

- Aplicar como máximo cuatro veces por temporada con un intervalo mínimo de 7 días entre una aplicación y otra cuando se opte por periodos cortos de protección o de 14 días cuando se opte por periodos largos de protección. No aplicar más de dos veces en forma consecutiva.
- Se recomienda aplicar con un volumen de agua acorde a la cantidad de follaje de las plantas al momento de la aplicación. Se sugieren volúmenes entre 1.200 y 1.800 L/ha en parronales y entre 700 y 1.200 L/ha en espalderas.
- Con equipos de bajo volumen aplicar un mínimo de 70 cc/ha para intervalos cortos y 150 cc/ha para intervalos largos, en parrones aplicar un mínimo de 105 cc/ha y 220 cc/ha respectivamente.

Preparación de la Mezcla:
Poner el agua en el estanque del equipo aplicador hasta la mitad, agregar la dosis requerida de **CRONOS 25 SC,** manteniendo el agitador en marcha, luego rellenar con agua hasta completar el volumen deseado. Aplicar siempre con el agitador funcionando.

Incompatibilidad:
No mezclar con productos que contengan boro ni aquellos de marcada reacción alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios de uso común, puede ser aplicado con ácido giberelico.
Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

Fitotoxicidad:
CRONOS 25 SC no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso:
12 horas para ingresar al sector tratado, para personas y animales.