

HERBICIDA

OVASSION EXTRA

POLVO MOJABLE (WP)

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 3539

OVASSION EXTRA, Herbicida sistémico, selectivo indicado para el control de las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION :

Yodosulfurón-metilo-sodio (*)	3,2 % p/p (32 g/kg)
Metsulfurón-metilo (**)	1,0 % p/p (10 g/kg)
Coformulantes, c.s.p.	100% p/p (1 kg)

* Sal sódica del 4-yodo-2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamosulfamoil)benzoato de metilo

** 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato de metilo

<< LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO – CHILE

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA- CHILE

Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.

Town South Donghua District, Longyou County,
Zhejiang, China
ZIP N° 324400

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

CUIDADO



W0150216

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

OVASSION EXTRA, herbicida, en base a Yodosulfurón-metilo-sodio y Metsulfurón-metilo, pertenecientes al grupo químico de las sulfonilureas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del polvo mojable usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

OVASSION EXTRA, es tóxico para algas, ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos y prácticamente no tóxico para aves y peces. Ligeramente tóxico para abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<<LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

<< PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de contacto cutáneo: lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón. En caso de contacto ocular: lavar los ojos con agua por al menos 15 minutos. En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona contaminada, mantenerlo en reposo al aire libre, mientras llega o reciba ayuda del médico. En caso de ingestión: dar a ingerir una taza de agua y luego trasladar al afectado al hospital más cercano. No inducir el vómito. En todos los casos trasladar en forma inmediata a un centro asistencial.

Síntomas de Intoxicación: náuseas, vómitos y diarrea, mínimamente irritante ocular.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia:

(2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **OVASSION EXTRA**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

INSTRUCCIONES DE USO

OVASSION EXTRA, es un herbicida sistémico, selectivo, recomendado para el control postemergente de las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso, en cultivos de trigo

Cuadro de instrucciones de uso

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES	CARENCIA (Días)
Trigo	Ballica, Avenilla.	500 – 600 g/ha	Aplicar al inicio del crecimiento, idealmente entre 2 – 4 hojas de las malezas, hasta fin de macolla. Es óptimo aplicar cuando la mayoría de las malezas han emergido.	NC
	Siete venas, Pasto pinito, Calabacillo, Duraznillo, Viola, Sanguinaria, Diente de león, Tomatillo, Verónica, Manzanillón y Quinguilla	500 – 600 g/ha	Aplicar con malezas pequeñas, idealmente entre 2 y 4 hojas (no mayores a 6 hojas).	

Instrucciones de uso:

- Se recomienda mezclar con Winspray Miscible.
- Evite aplicar el herbicida en plantas sometidas a cualquier tipo de stress.
- Para lograr un buen cubrimiento, se recomienda utilizar aproximadamente 150 a 200 litros de agua por hectárea.
- Aplicar dosis menor con malezas de menor tamaño (2 hojas) y baja presión de malezas. Usar dosis mayor con malezas de mayor tamaño (4 hojas) y alta presión de malezas.
- Se puede aplicar vía aérea utilizando cubrimientos de 40 a 60 Lt de agua/ha aproximadamente.
- Realizar como máximo 1 aplicación por temporada.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 10 Km/hora, usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser necesario
- Evitar aplicar con temperaturas superiores a 30°C, idealmente temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.
- Evitar aplicar sobre follaje mojado o con tierra.
- Evitar aplicar en condiciones de stress del cultivo provocado por sequía, exceso de agua, bajas temperaturas y/o heladas, deficiencias nutricionales, plagas o enfermedades.
- Considerar 6 horas libres de precipitaciones después de la aplicación.

Preparación de la mezcla: Llenar el equipo de aplicación hasta la mitad con agua. Luego agregar la dosis requerida de **OVASSION EXTRA** manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

Compatibilidad: Compatible con Winspray Miscible. Para mezclas no conocidas se recomienda siempre efectuar una prueba previa de compatibilidad.

Incompatibilidad: Incompatible con productos de reacción alcalina. Se recomienda no mezclar con otros herbicidas.

Fitotoxicidad: La aplicación del producto puede ocasionar una clorosis inicial en las plantas tratadas pero es de carácter temporal, sin afectar significativamente el desarrollo vegetativo del cultivo.

Tiempo de Reingreso: Se deben esperar 4 horas para reingresar al área tratada para animales y personas, sin equipo de protección personal. Antes de reingresar se recomienda verificar que la aspersión se haya secado sobre el follaje tratado.

CUIDADO

