07/2012 Stimo WP, 1 de 3

STIMO WP

FUNGICIDA POLVO MOJABLE (WP)

ADVERTENCIA: La información contenida en este documento es solo de carácter referencial y no reemplaza a la información contenida en la etiqueta adherida al envase del producto. Lea siempre la etiqueta antes de manipular o usar un producto fitosanitario.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2750

STIMO WP, es un fungicida de contacto, preventivo y protector, recomendado para el control de Tizón tardío en papa, Mildiu en cebolla, en ajo y en arveja.

COMPOSICION:

Mancozeb (*)	p (727 g/kg)
Zoxamida (**)	o/p (73 g/kg)
Coformulantes c.s.p. 100	% p/p (1 kg)
(*) Complejo (polimérico) de etilenbis(ditiocarbamato) manganoso con sal cínquica	
(**) (RS)-3,5-dicloro-N-(3-cloro-1-etil-1-metil-2-oxopropil)-p-toluamida	

<< LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Lote N°: Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A Almirante Pastene 300 - Providencia SANTIAGO – CHILE

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA – CHILE

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO









PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

STIMO WP, es un fungicida cuyo ingrediente activo Mancozeb, pertenece al grupo de los alquilenbis (ditiocarbamatos) y Zoxamida, pertenece al grupo de las benzamidas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del producto usar delantal impermeable, protector facial, guantes y botas de goma o impermeables. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC, gafas, guantes y botas de goma o impermeables y mascara con filtro. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Durante una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

PARA APLICACIONES AÉREAS SE DEBEN RESPETAR LAS DISPOSICIONES QUE HAYA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE

STIMO WP, es moderadamente tóxico para peces, muy toxico para microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para aves y prácticamente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>
<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>
<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>
<< LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>
<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de contacto cutáneo: retire la ropa y zapatos contaminados. Limpie bien los restos del producto y luego lave la piel con agua y jabón.

En caso de contacto ocular: lave inmediatamente los ojos con agua tibia, manteniendo los párpados abiertos, por lo menos durante 15 minutos.

En caso de inhalación: retirar al paciente del área expuesta y llevarlo al aire libre.

En caso de ingestión: si la persona está consciente, administre una taza de agua, pero NO PROVOQUE vómitos.

En todos los casos mantenga al paciente en reposo mientras se le envía al hospital más cercano.

Síntomas: Se puede presentar aliento y olor a ajos, irritación de mucosas que se manifiesta como faringitis, rinitis y conjuntivitis, náuseas, vómito y diarrea, cefalea, debilidad y excitabilidad aumentada.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 7771994 (CORPORACIÓN RITA); (2)4869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve STIMO WP, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingrediente Activo de los envases debidamente sellados.

Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje.

INSTRUCCIONES DE USO

STIMO WP, es un fungicida de contacto, preventivo y protector, con acción específica sobre tizón tardío en papa, Mildiu en cebolla, en ajo y en arveja. Por ser un fungicida protector de contacto se debe usar en forma preventiva. Tiene un modo de acción diferente sobre el hongo, ya que Zoxamida actúa paralizando la división celular, por la ligación de la tubulina y ruptura de los microtúbulos, mientras que Mancozeb presenta una inhibición de acción múltiple.

Aplicación terrestre

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
PAPA	Tizón tardío (Phytophthora infestans)	2,0 - 2,5	Aplicar en forma preventiva cada 7 a 10 días según la presión de la enfermedad, desde la emergencia de 3 tallos del cultivo.	7
CEBOLLA AJO	Mildiú	2,0 - 2,5	Aplicar en forma preventiva cada 7 a 10 días, según la presión de la enfermedad.	7
ARVEJA	Mildiú	2,0 - 2,5	Aplicar en forma preventiva, según la presión de la enfermedad, desde que el cultivo estè en estado de tres nudos. Repetir cada 10 a 15 días en caso de ser necesario.	7

Aplicación aérea

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
PAPA	Tizón tardío (Phytophthora infestans)	2,0 - 2,5	Aplicar en forma preventiva cada 7 a 10 días según la presión de la enfermedad, desde la emergencia de 3 tallos del cultivo.	7

Observaciones:

- · Aplicar con un volumen de agua suficiente para lograr una cobertura completa del follaje. El volumen de agua sugerido para aplicación terrestre es de 350 a 1.000 L/ha, variando según el estado de desarrollo del cultivo y de 20 a 60 L/ha para aplicación aérea.
- Se recomienda usar surfactante para optimizar el cubrimiento de la aplicación y su adherencia a las hojas tratadas.
- Usar dosis menor con baja presión de la enfermedad y dosis mayor con presiones medias a altas.
 Aplicar como máximo 5 veces por temporada con un intervalo mínimo de 7 días entre una aplicación y otra.

Preparación de la mezcla:

Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua a utilizar, agregar la dosis requerida de Stimo WP, luego completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante. Al final agregar el surfactante.

Incompatibilidad:

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con productos alcalinos. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

Fitotoxicidad:

No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso:

12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.