








# Avena

		PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-SIEMBRA	PRE-EMERGENCIA	1-2 HOJAS	3-4 HOJAS	INICIO DE MACOLLA	PLENA MACOLLA	1° A 2° NUDO	HOJA BANDERA	ESPIGADURA
FUNGICIDAS		Carbones y otras enfermedades que atacan tempranamente		<b>Podio</b> Traker								
		Royas y Oidio								<b>TYRONE X-TRA</b>		
HERBICIDAS		Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas	<b>Rango Full</b> + <b>AJAX</b> + Esteron Ten Ten									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas resistentes a glifosato	<b>Rango Full</b> (1) + <b>AQUILES</b> o <b>Kazero</b> +									
		Malezas, gramíneas y hoja ancha			<b>BINOMIO</b>	<b>Partidor</b>						
		Malezas de hoja ancha			<b>Dazzler</b>	<b>MCPA + AJAX + ZOOM</b> <b>TWIN</b> (2) + Pirel (3)						
INSECTICIDAS		Insectos que atacan a la semilla y prevención de insectos (larvas y adultos) que afectan a la germinación y emergencia		<b>punto</b> ECO <sup>2</sup>								
		Insectos del follaje						<b>punto</b> (4)	<b>LADIADOR</b> (4)			
REGULADORES DE CRECIMIENTO		Tendadura							<b>Belcocel</b>			
									<b>Armador</b>			
NUTRICIÓN VEGETAL		Estimular crecimiento y producción		<b>Phyllum</b> MAX <sup>R</sup>					<b>Stamplex + AminoMAX</b>			
								<b>Poly-Zn</b>	<b>AminoMAX</b> + <b>Phyllum</b> MAX <sup>R</sup>		<b>Poly-B + Poly-Mg</b>	

(1) Cuando Rango Full + Aquiles se aplican en barbecho químico, se debe respetar un período mínimo de resguardo antes de la siembra de al menos 15 días.

(2) Con presencia de sanguinaria, porotillo, duraznillo y tréboles.

(3) Con presencia de manzanillón y crepis.

(4) En trámite de extensión de etiqueta SAG.

-Si hay generación de espuma al preparar la mezcla, utilizar **Taison S**