







# Avena

		PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-SIEMBRA	PRE-EMERGENCIA	1-2 HOJAS	3-4 HOJAS	INICIO DE MACOLLA	PLENA MACOLLA	1° A 2° NUDO	HOJA BANDERA	ESPIGADURA
FUNGICIDAS		Carbones y otras enfermedades que atacan tempranamente		<b>PODIO</b>								
		Manchado de grano									<b>TYRONE X-TRA</b>	
HERBICIDAS		Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas	<b>Rango Full</b> + <b>AJAX</b> + <b>Esteron Ten Ten</b>									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas resistentes a glifosato	<b>Rango Full</b> (1) + <b>AQUILES</b> + <b>PRAX</b>									
		Malezas, gramíneas y hoja ancha		<b>BINOMIO</b>	<b>Partidor</b>							
		Malezas de hoja ancha			<b>MCPA + AJAX + ZOOM</b> <b>TWIN</b> (2) + <b>Pirel</b> (3)							
INSECTICIDAS		Insectos que atacan a la semilla y prevención de insectos (larvas y adultos) que afectan a la germinación y emergencia		<b>punto</b>								
		Insectos del follaje						<b>ORBITA</b>				
REGULADORES DE CRECIMIENTO		Tendadura						<b>BelcoCel</b>				
								<b>Armador</b>				
BIBIESTAR VEGETAL		Fertilización Foliar Balanceada					<b>MARTELLO</b> + <b>AminoMAX</b>				<b>Poly-B + Poly-Mg</b> <b>KELPURA</b>	
							<b>Poly-Zn</b>					

(1) Cuando Rango Full + Aquiles se aplican en barbecho químico, se debe respetar un período mínimo de resguardo antes de la siembra de al menos 15 días.

(2) Con presencia de sanguinaria, portillo, duraznillo y tréboles.

(3) Con presencia de manzanillón y crepis.