







Cebada

		PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-SIEMBRA	PRE-EMERGENCIA	1-2 HOJAS	3-4 HOJAS	INICIO DE MACOLLA	PLENA MACOLLA	1º Y 2º NUDO	HOJA BANDERA	ESPIGADURA
FUNGICIDAS		Carbones y otras enfermedades que atacan tempranamente		Impulso PODIO								
		Enfermedades del follaje Helminthosporiosis Rincosporiosis Otras						TYRONE 250EC TYRONE X-TRA				
HERBICIDAS		Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas	Rango Full + AdAX + Esteron Ten Ten									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas resistentes a glifosato	Rango Full (1) + AQUILES + GLIFOSATO									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas			BINOMIO (4) Theron Max (4)		ovASSION + ZUCOM					
	Malezas de hoja ancha					MCPA + AdAX + ZUCOM TVIN (2) + Pirel (3)						
	Malezas gramíneas					Partidor						
INSECTICIDAS		Insectos que atacan a la semilla y prevención de insectos (larvas y adultos) que afectan a la germinación y emergencia		punto <small>ECO-FIT</small>								
		Insectos del follaje					ORBITA					
	Pulgones y Cuncunillas						punto	HURRICANE				
REGULADORES DEL CRECIMIENTO		Tendadura y promotor de rendimiento							Armador			
BIENESTAR VEGETAL		Fertilización foliar balanceada					AminoMAX		MARTELLO			
						Poly-Zn					Poly-B	KELPURA

(1) Cuando Rango Full + Aquiles se aplican en barbecho químico, se debe respetar un período mínimo de resguardo antes de la siembra de al menos 15 días.

(2) Con presencia de sanguinaria, porotillo, duraznillo y tréboles.

(3) Con presencia de manzanillón y crepis.

(4) Extensión de etiqueta en trámite SAG.