







Avena

		PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-SIEMBRA	PRE-EMERGENCIA	1-2 HOJAS	3-4 HOJAS	INICIO DE MACOLLA	PLENA MACOLLA	1º A 2º NUDO	HOJA BANDERA	ESPIGADURA
FUNGICIDAS		Carbones y otras enfermedades que atacan tempranamente		Podio								
		Manchado de grano										TYRONE X-TRA
HERBICIDAS		Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas	Rango Full + AJAX + Esteron Ten Ten									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas resistentes a glifosato	Rango Full (1) + AQUILES o Kazero									
		Malezas, gramíneas y hoja ancha		BINOMIO		Partidor						
		Malezas de hoja ancha					MCPA + AJAX + ZOOM TWIN (2) + Pirel (3)					
INSECTICIDAS		Insectos que atacan a la semilla y prevención de insectos (larvas y adultos) que afectan a la germinación y emergencia		punto								
		Insectos del follaje									ORBITA	
REGULADORES DE CRECIMIENTO		Tendadura							Belcocel		Armador	
NUTRICIÓN VEGETAL		Fertilización Foliar Balanceada							Stimplex + AminoMAX			Poly-B + Poly-Mg
									Poly-Zn			
									AminoMAX			

(1) Cuando Rango Full + Aquiles se aplican en barbecho químico, se debe respetar un período mínimo de resguardo antes de la siembra de al menos 15 días.

(2) Con presencia de sanguinaria, porotillo, duraznillo y tréboles.

(3) Con presencia de manzanillón y crepis.