







Cebada

		PROBLEMA	BARBECHO QUÍMICO	PRE-SIEMBRA	PRE-EMERGENCIA	1-2 HOJAS	3-4 HOJAS	INICIO DE MACOLLA	PLENA MACOLLA	1º Y 2º NUDO	HOJA BANDERA	ESPIGADURA
FUNGICIDAS		Carbones y otras enfermedades que atacan tempranamente		Impulso Indar Flo Podio								
		Enfermedades del follaje Helminthosporiosis Rincosporiosis Otras					TYRONE 250EC TYRONE X-TRA					
HERBICIDAS		Alta presencia de malezas de hoja ancha y gramíneas	Rango Full + AdAX + Esteron Ten Ten									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas resistentes a glifosato	⁽¹⁾ Rango Full o Kazero									
		Malezas de hoja ancha y gramíneas			BINOMIO ⁽⁴⁾ Theron Max ⁽⁴⁾	OvASSION + ZOOM						
	Malezas de hoja ancha				MCPA + AdAX + ZOOM TVIN (2) + Pirel (3)							
	Malezas gramíneas				Partidor							
INSECTICIDAS		Insectos que atacan a la semilla y procreación de insectos (larvas y adultos) que afectan a la germinación y emergencia		punto ^{ECO-FE}								
		Insectos del follaje Pulgones y Cuncunillas					ORBITA punto HURRICANE					
REGULADORES DEL CRECIMIENTO		Tendredura y promotor de rendimiento							Armador			
NUTRICIÓN VEGETAL		Fertilización foliar balanceada					AminoMAX					
							Poly-Zn				Poly-B	

(1) Cuando Rango Full + Aquiles se aplican en barbecho químico, se debe respetar un período mínimo de resguardo antes de la siembra de al menos 15 días.

(2) Con presencia de sanguinaria, porotillo, duraznillo y tréboles.

(3) Con presencia de manzanillón y crepis.

(4) Extensión de etiqueta en trámite SAG.