

# HUMMER® 24 EC

HERBICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.486

**HUMMER® 24 EC**, es un herbicida sistémico, para el control de post-emergente de malezas gramíneas en trigo, descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

**COMPOSICIÓN:**

*Clodinafop-propargil .....	24% p/v (240 g/l)
**Cloquintocet-mexilo (protector) .....	6% p/v (60 g/l)
Coformulantes c.s.p .....	100% p/v (1 l)
* (R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoropiridin-2-iloxi)fenoxi]propanoato de prop-2-inilo	
** (5-cloroquinolin-8-iloxi)acetato de 1-metilhexilo	

**<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>**

Importado y Distribuido por:



**ANASAC CHILE S.A**

**Almirante Pastene 300 - Providencia**

**SANTIAGO – CHILE**

**Lote N°:**

**Contenido Neto:**

**Fecha Vencimiento:**

Fabricado por:

**ANASAC CHILE S.A**

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA – CHILE

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC**

**CROP SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District, Longyou County,

Zhejiang, China, ZIP N° 324400

**QINGDAO JINER AGROCHEMICAL R&D CO. LTD.**

N° 1 Jiner Road, Jiazhouwan Industrial Park,

Economic and Technological Development Zone, Jiaozhou Qingdao, China

**INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

**HUMMER® 24 EC**, es un herbicida sistémico, cuyo ingrediente activo Clodinafop-propargilo pertenece al grupo químico de los ariloxifenoxipropanatos y el protector Cloquintocet-mexilo pertenece al grupo químico de las quinolinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable. Usar protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**HUMMER® 24 EC**, es moderadamente tóxico para peces. Prácticamente no tóxico para aves y microcrustáceos. Virtualmente no tóxico para abejas.

**<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>**

**<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>**

**<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>**

**<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>**

**<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>**

**<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>**

**Instrucciones para el triple lavado:** Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. No tiene antidoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos,** trasladar de inmediato a un centro asistencial llevando la etiqueta del producto.

**Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático. En caso de convulsiones se puede administrar diazepam. **Síntomas de intoxicación:** Ardor en la boca, malestar epigástrico, náuseas, vómitos, tos, trastornos respiratorios.

**<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>**

**Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24706888 (ANASAC)**

**<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>**

Conserve **HUMMER® 24 EC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de AGRICOLA NACIONAL S.A.C. E. I.



**CUIDADO**

## INSTRUCCIONES DE USO

**HUMMER® 24 EC**, es un herbicida sistémico para el control post emergente de malezas gramíneas descritas en el cuadro de instrucciones de uso en trigo.

### Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (cc/ha)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Trigo	Avenilla, Cola de Zorro	250	Puede aplicarse en cualquier momento después de que el trigo tenga tres hojas en post emergencia de las malezas. Para malezas anuales aplicar en los primeros estados de desarrollo y antes del inicio de macolla, en activo crecimiento y con temperaturas medias. En malezas perennes aplicar cuando haya un desarrollo foliar que permita una buena absorción del producto (aproximadamente en macolla).	No Corresponde
	Ballica, Pasto Cebolla, Chépica, Pega-pegá, Tembladera, Tembladerilla	300		

### Observaciones:

- No aplicar en cultivo de trigo estresado por heladas, exceso o deficiencia de humedad u otras causas.
- En aplicaciones terrestres utilizar un mojado de 200 litros por hectárea.
- Existen biotipos de maleza gramíneas (ballicas, avenillas) con diferente grado de susceptibilidad al herbicida.
- Realizar como máximo 4 aplicaciones por temporada.

### Preparación de la Mezcla:

Poner agua en el estanque del equipo aplicador hasta la mitad, agregar la dosis requerida de **HUMMER® 24 EC**, manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

### Compatibilidad:

**HUMMER® 24 EC**, se puede aplicar junto a metsulfuron metil para el control simultáneo de malezas gramíneas y hoja ancha. Además, es compatible con funguicidas como propiconazole y tebuconazole, para el control simultáneo de malezas gramíneas y enfermedades foliares en trigo.

### Incompatibilidad:

Es incompatible con herbicidas hormonales. Separar las aplicaciones de productos no compatibles 5 a 7 días de una de **HUMMER® 24 EC**.

### Fitotoxicidad:

**Hummer® 24 EC** no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**Tiempo de reingreso:** 4 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



**CUIDADO**