

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

PODIO® 200 FS es un fungicida cuyo ingrediente activo Triticonazol pertenece al grupo químico de los triazoles. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación de la suspensión concentrada para tratamiento de semillas usar delantal impermeable, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC, máscara con filtro, guantes impermeables, antiparras y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las semillas tratadas con el producto no deben ser usadas para consumo humano y/o animal. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

<< LAS SEMILLAS TRATADAS NO DEBEN SER USADAS PARA CONSUMO HUMANO, DE ANIMALES O AVES >>

Información ecotoxicológica: **PODIO® 200 FS** es moderadamente tóxico para algas y microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para peces, aves y abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para el triple lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta $\frac{1}{4}$ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Al terminar el triple lavado inutilice los envases para evitar su reutilización.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. **En todos los casos** mantenga al paciente en reposo mientras se le envía al hospital más cercano llevando la etiqueta o envase del producto. **Síntomas de intoxicación:** Irritaciones a nivel ocular y de las vías respiratorias.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **PODIO® 200 FS**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® **Marca registrada de ANASAC CHILE S.A.**

PODIO® 200 FS

**FUNGICIDA
SUSPENSION CONCENTRADA
PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS (FS)**

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.939

PODIO® 200 FS, es un fungicida recomendado para tratamiento de semilla de cereales y maíz, perteneciente al grupo de los triazoles. Logra un amplio periodo de protección, desde la germinación hasta un avanzado estado de desarrollo de la planta, controlando enfermedades que se transmiten por la semilla, como enfermedades del tallo y hoja que se mencionan en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

* Triticonazol	20% p/v (200 g/l)
Coformulantes c.s.p.	100% p/v (1 l)
* (RS)-(E)-5-(4-clorobenciliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol	

**<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO
ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>**

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300
Providencia - Santiago

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

Lampa, CHILE

**ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC
CROP SCIENCE CO., LTD.**

Town South Donghua District, Longyou County ZIP: 324400
ZHEJIANG, CHINA.

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

PODIO® 200 FS es un fungicida recomendado para tratamiento de semilla de cereales y maíz, perteneciente al grupo de los triazoles. Actúa inhibiendo la biosíntesis de esteroides. Logra un amplio período de protección, desde la germinación hasta un avanzado estado de desarrollo de la planta, controlando enfermedades que se transmiten por la semilla, como enfermedades del tallo y hoja.

Cuadro de Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Trigo blanco, Trigo candeal, Cebada, Avena, Triticale	Carbón hediondo (<i>Tilletia caries</i>) Carbón volador (<i>Ustilago tritici</i>) Fusariosis (<i>Fusarium graminearum</i>)	30 cc/100 kg semillas	Mezclar en forma homogénea de manera que las semillas queden totalmente cubiertas con el producto, usar tambor mezclador o máquina para tratamiento de semillas. Para permitir una mejor distribución del producto sobre las semillas, en trigo, avena y cebada se puede agregar 1,0 a 1,5 L de agua por cada 100 kg de semillas. Para maíces agregar entre 0,5 a 1 L de agua cada 30 kg de semilla. Para el tratamiento de supresión de mal del pie usar dosis menor en siembras con adecuada rotación y sin antecedentes de alta presión de esta enfermedad. En maíz para el control de carbón de la panoja o mazorca usar dosis mayor en siembras en sectores con historial de alta presión de la enfermedad.
	Carbón hediondo (<i>Tilletia caries</i>) Carbón volador (<i>Ustilago tritici</i>) Ataques tempranos de enfermedades foliares: Óidio (<i>Blumeria graminis</i>) Mancha ocular (<i>Oculimacula yallundae</i>) Roya (<i>Puccinia spp.</i>) Septoriosis (<i>Mycosphaerella graminicola</i>) Rincosporiosis (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	120 cc/100 kg de semillas	
	Supresión de Mal del Pie (<i>Gaeumannomyces graminis</i>)	300 – 600 cc/100 kg semillas	
	Carbón de la panoja o mazorca (<i>Sphacelotheca reiliana</i>)	500 – 600 cc/100 kg de semillas o 150 cc/bolsa de 25 a 30 kg de semillas	
Maíz	Carbón de la panoja o mazorca (<i>Sphacelotheca reiliana</i>)	500 – 600 cc/100 kg de semillas o 150 cc/bolsa de 25 a 30 kg de semillas	

Instrucciones de Uso: Se debe aplicar previo al momento de siembra de las semillas. Almacenar las semillas tratadas en un lugar fresco y seco hasta la siembra. Las semillas tratadas deben ser utilizadas inmediatamente después realizado el tratamiento y no deben guardarse de una temporada a otra. Aplicar una vez por temporada.

Preparación de la mezcla: Antes de usar el producto se debe agitar el envase fuertemente, por al menos 3 minutos. Posteriormente se aplica directamente sobre las semillas, usando tambor mezclador o máquinas para tratamiento de semillas.

Compatibilidad: **PODIO® 200 FS** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común destinados a semillas. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: **PODIO® 200 FS** es incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4.

Fitotoxicidad: **PODIO® 200 FS** no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta. En las dosis más altas, puede producir un leve retraso en la germinación de las semillas tratadas, sin afectar el desarrollo o rendimiento posteriores del cultivo.

Carencias: No corresponden por la naturaleza de la aplicación.

Tiempo de reingreso: No corresponde indicar período de reingreso para personas ni animales por la naturaleza de la aplicación.



NOCIVO

