

GUÍA DE COLOCACIÓN

1. Prepararse para la colocación



- Determine el patrón de colocación según el marco de plantación
- Lea a etiqueta
- Usar el EPP necesario

2. Cubo



- Un cubo contiene 1000 difusores
- La dosis de aplicación es 250/ha

3. Patrón de colocación



- Comience a colgar los difusores en la primera fila siguiendo el patrón de colocación

4. Colocación



- Cuelguélos en la base de los cargadores
- Realice la colocación en el lado más sombreado de la planta

5. Continuación



- Cuando alcance el final de la fila pase a la siguiente
- Fíjese que algunos patrones de colocación alternan de fila a fila

6. Bordes



- Use cualquier difusor adicional para colgarlo en los bordes o en las zonas de alta presión de la plaga

GUÍA DE COLOCACIÓN

Uva de mesa

Espacio Entre Hileras	Espacio Entre Plantas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	2	hilera	☐															☐
		hilera alterna				☐												
3.5	3	hilera	☐															
		hilera alterna																
3.5	2.5	hilera	☐															
		hilera alterna																
3.5	2	hilera	☐															
		hilera alterna																
3.5	1.75	hilera	☐															
		hilera alterna																
3.5	3.5	hilera	☐															
		hilera alterna																
4	3	hilera	☐															
		hilera alterna																

Uva de vino

Espacio Entre Hileras	Espacio Entre Plantas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1	hilera	☐														
		hilera alterna															
2	1.2	hilera	☐														
		hilera alterna															
2.2	1	hilera	☐														
		hilera alterna															
2.2	1.2	hilera	☐														
		hilera alterna															
2.5	1.5	hilera	☐														
		hilera alterna															
2.7	1.4	hilera	☐														
		hilera alterna															
2.7	1.5	hilera	☐														
		hilera alterna															

Los patrones de colocación pueden ser personalizados para su viñedo

Contacte con su distribuidor para una recomendación personalizada para apoyar su programa de confusión sexual



El uso de herramientas de interrupción del apareamiento debería formar parte de un programa general de manejo integrado de plagas (GIP). El uso de otras medidas de control de plagas puede ser necesario y debe basarse en una adecuada supervisión de las plagas y en la exploración del terreno.

