

**Probióticos
para terneros**

Probios® Bac



Anasac presenta Probios Bac, microorganismos vivos que promueven beneficios en la salud de los terneros.

www.anasac.cl



anasac

Probios® Bac

La flora intestinal y ruminal del ternero recién nacido es prácticamente inexistente, por esta razón, se debe implementar un adecuado programa de calostro, para aportar las inmunoglobulinas necesarias para los primeros días de vida.

Junto con un adecuado programa de calostro, es importante además promover un adecuado estatus sanitario e inmunológico de los terneros a través del uso de probióticos (bacterias buenas). Éstos colonizarán el tracto digestivo otorgando más protección ante eventuales riesgos de enfermedades. Cuando los terneros son sometidos a terapias antimicrobianas, como tratamientos curativos a enfermedades infecto-contagiosas, no sólo se eliminan las bacterias patógenas, sino que además las bacterias saprófitas. Éstas viven habitualmente en el organismo y son parte de la flora beneficiosa de los animales.

El uso de Probios Bac Gel, va de la mano con la tendencia mundial que busca disminuir el uso de antibióticos, debido a la relación que existe entre el uso de estos y la resistencia antimicrobiana en salud animal y también en la salud pública.

Con Probios Bac mejoramos el estatus inmunitario de los terneros, promoviendo el menor uso de antibióticos.

Probios Bac Gel son:

Microorganismos vivos que promueven beneficios en la salud en los terneros.

Características:

- Promueven el equilibrio y la biorregulación de la microbiota intestinal.
- Maximiza la eficiencia alimentaria y productiva.
- Protege el tracto gastrointestinal.
- Mejora la absorción de nutrientes.

CHR HANSEN


Improving food & health

Composición por gramo de producto:

Recuento total de microorganismos	(mín.) 1,0 x 10 ⁷ UFC/g
Donde:	
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	(mín.) 3,3 x 10 ⁶ UFC/g
<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i>	(mín.) 3,3 x 10 ⁶ UFC/g
<i>Enterococcus faecium</i>	(mín.) 3,3 x 10 ⁶ UFC/g

Recomendaciones de uso:

- Terneros recién nacidos: 3g al nacer y repetir a las 24 horas.
- Terneros con diarrea: 5g y repetir a las 24 y a las 48 horas.
- Terneros sometidos a terapia antibiótica: 5g y repetir a las 24 horas.



Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl

● **Coquimbo:** 51 267 7820

● **Talca:** 71 253 4990

● **Osorno:** 64 261 4440

● **Santiago:** 2 2486 9176

● **Chillán:** 42 283 6690

● **Requínoa:** 72 297 8220

● **Lautaro:** 45 265 8066